

識
病
捷
法

識病捷法卷之八

蘇郡長洲慕松繆存濟纂集

急救門

有二十二名

人之卒暴死於非命有可矜而不可憫之分如積德過厚之人或縱情嗜慾精血虧少神思昏迷以致困死魘死喜死笑死邪氣乘虛客於小腸卒死邪鬼襲着失志或有屈無伸投河自刎自縊情有可矜而急救之術可施若人之陰謀尅簿官府加

刑天神譴責以致失風落水自縊自刎縊於口福
食盡天祿饑寒無柰至於凍死憂死驚死哭死情
不可憫法不可宥而迴生之策固有而不可與之
治此門雖立人多忽之所以列於卷之前也
卒死

邪氣客於小腸經絡善令人卒死○用菖蒲灌
法

縊死

凡自縊死從早至晚雖已冷必可活從夜至早
稍難若心下溫一日已上猶可救抱其身緩緩

四肢直口噤冷氣入臟陽氣暴絕以大器中多
熬灰煖囊盛煖灰縛置其心冷則更易心煖氣
通目則得轉口亦能開可與溫酒飲之粥清少
少燕之若不先溫其心便將火灸其身冷氣與
火相搏恐難治耳如甦服生姜陳皮各一兩水
三鍾煎鍾半分三次溫飲不可熱亦不可冷
凍死

用鹽或草荐裹之以索縛定放在平穩處今兩
人對面輕輕袞轉往來如匙攪四肢溫即活仍
灸臍中三五壯凡冬月凍倒人扶在煖處不得

就於熱湯及向火與熱湯必死雪泥中行便近
火脚指隨落隨服生姜陳皮煎服法同前

淘井開塚傷人

五六七月井中極深塚中皆有伏毒之氣入則
令人悶冒殺人先以鷄毛放井中試之如搖動
不肯便下是有毒氣不可入古塚亦然若不得
已而入用酒數升先洒井塚中四邊停少時然
後可入若覺有此氣鬱悶淹淹欲死者取其中
水洒人面亦令人飲之又以灌其頭及身解即
活若無水取其中土浸水用之服雄黃末一二

解繩切不可割斷放卧令人踏其肩以手提其
髮常令一人緊以手擦背脇散動之一人摩臂
足屈伸之若已僵但漸漸足屈之又按其腹更
以兩人筆管吹其兩耳又以手掩其口勿令透
氣煎官桂湯少與飲及粥飲潤喉一飯時即氣
口中出呼吸眼開勿苦勞動皂角細辛為細末
吹兩鼻中刺鷄冠血滴看口中男用雌鷄女用
雄鷄如救之不活用車載法用絹緊絞身體令
堅以車載行三十里許使人車上踏肩引髮如
前

落水死

已經半日者取大甕覆地以死人腹伏甕上用
微火于甕中燃之正射死人心下須臾死人心
下甕覺暖水出盡即甕勿令過熱用不蛀皂角
為細末以葱白絞汁或棗穰為丸如棗大內下
部中其水自出皂末吹鼻中艾炙臍中百壯已
經一宿救法先尿死人兩脚著生人脊上以死
人背貼生人背搭足吐出水即活又方解開死
人衣炙臍中即活

冬月落水死

錢如轉筋入腹欲死者用生姜一兩劈破酒五六盞煎令頓服又醋煮衣絮令微溫裹轉筋濃煎鹽湯洗手足胸脇間即甦

火燒傷人

被賊燒薰或火發煙薰燒壞欲死迷悶搗爛蘿蔔自然汁灌下咽即甦

困死

切勿以火照照之殺人但痛咬其足拇指甲際及多唾其面即活用菖蒲末吹兩鼻中桂末吹

舌下

睡中斃死

用復生散即活

墮壁或重物壓傷人

用半夏泡去滑每用一粒為末吹入鼻中即活
心頭溫者可治

蛇毒傷人

用青黛雄黃各等分研細末每服二錢新汲水
調下

竹木刺傷人

見損傷門

湯火傷人

見損傷門

驚死

心下溫者刺手少陽之源卽是兌骨穴也乃是
真心之源在手掌後兌骨之端陷中是穴用長
針口中溫暖刺入三分徐徐出針以手捫其穴
暴驚欲死

針下臆二穴在三里下二寸針入五分

憂死

無氣手足冷心腹口鼻溫目中神彩不轉口中

無涎舌外不縮可刺冷骨穴針入三分徐徐出針以手捫其穴人復活也

憂懼成疾

服人參半夏玄胡索炒各君肉桂甘草各臣乳香佐用水二鍾姜三片煎至一鍾食後服

喜死

四肢冷氣絕色不變者刺陽池穴用口溫針勿令針入三分徐徐出針以手捫其穴即復甦也
喜笑欲死

針列缺穴在手大指後臂上三寸及大陵二穴

在掌後橫紋中針入三分

笑死

凡口中有微氣心下溫者用蒼鹽成塊者二兩
火燒令通赤候冷研細以河水一大碗同煎至
三五沸放溫分三次服之後以鵝翎探其喉中
吐去熱痰三五升後服黃連解毒湯三貼則笑
自定人可保矣

笑脫下頰

用線纏綿毬二箇塞於左右牙床後用手托上

悲哭欲死

四肢冷身口溫者可針人中穴三分徐徐出針
灸百會穴三壯可治

魚鱗解毒湯

見人門

葛蒲瀉法

見神鬼門

復生散

開末

異症門

有二十九名

怪異之症皆痰所為蓋緣氣血精元虧欠以致經絡空虚津液獨敗成痰壅滯或因熱甚生痰悉為異症總治之法必當豁痰為先次理真氣則為穩當矣

肉球

口内生肉球臭惡有根線長五六寸如鉗股吐球出得飲食食罷却吞其線以手輕捏痛徹於心○用麝香一錢研細食後水調服三日驗

腹上麻痺不仁

多煮葱白食之自愈

氣奔

遍身皮裡忽混混如波浪聲痒不可忍抓之血
出亦不能解○服苦杖湯

血餘

手十指節斷惟有筋連肉間垂出如豎心長尺
餘遍身綠色○服胡黃連湯

手足甲忽然長倒出刺肉如錐痛不可忍○食葵
菜自愈

肝脹

眼睛垂出至鼻痛不可忍或時時大便血出○
用独活濃煎數盞服之自愈

下痢熱毒病

眼赤鼻脹大喘渾身出班毛髮盡起○服礬散

應聲虫

腹中有物作聲隨人言語○服雷丸自愈

真假人

自覺自形作兩人並卧不別真假不語問亦無
對○服長沙人參茯苓濃煎服之真者氣爽假

者化矣

異虫上行

頭面發熱有光色化人手近之如火燒○服

羊血生毛

食羊血過多遂生毛晝夜可長一二尺漸漸龐
圓如繩痛不可忍摘去復生○服乳香調砂各
一兩為末飯和九梧桐子大每服十九空心臨
卧各一服水送下

脇破腸出臭穢

急以油摸腸用手送入煎人參枸杞湯淋之皮
自合吃羊腎粥十日即愈

傷寒併熱癰亂

忽然氣上喘不能言語口中汁流吐逆齒皆搖
動氣出轉大則悶絕蘇復如是○服參黃湯
渾身生燎泡如甘棠梨每箇破出水內有石一片
如指甲大泡破復生抽盡肌肉則不可治○服
三稜散

大腸頭寸餘

用芝麻油浸臀腸又飲大麻子汁數升愈

肉壞

口鼻中腥臭水流以碗盛之有銹色鰕魚如米
大走躍手投之即化水○任意食鷄肉月餘愈
腎肝熱病

兩脚心凸如腫上面生黑色豆瘡硬似釘頭履
地不得脛骨碎髓流出身發寒惟思飲酒○用
炮川烏末傅之煎韭子湯服之愈

筋解

四肢節脫但有皮連不能舉動○服黃蘆三兩
酒浸取焙乾為末每二錢酒調下服盡即安

腹上麻痺

腹脹如石臍中出水變作虫行之狀繞身匝咏
痒痛難忍撥掃不盡○濃煎蒼朮湯浴之及以
蒼朮末入麝香少許水調服

血潰

眼白瞳仁渾黑見物如舊毛直如鐵線雖能飲
食不語如醉○用五靈脂為末每服二錢食前
酒調下

血注

遍身忽然肉出如錐痺痛不能飲食不速潰而

膿出。用赤皮葱數莖燒灰淋洗。喫鼓湯三盞自安。

脉溢

毛竅節次出血。若血不出。皮脹如鼓。須臾眼鼻口被氣脹合矣。用生薑自然汁水合半鍾服之而安。

眉毛搖動。目不能視。交睫喚之不應。但能飲食。有經日不効。用蒜三兩搗取汁酒調下。即愈。血自皮膚濺出。用煮酒甌上紙碎揉如楊花。以手捏在血出處立止。

因癰穿斷舌心血出不止諸藥不能收者

用米醋以鷄翎掃所斷舌處其血即止仍用真蒲黃杏仁研末蓬砂少許蜜調稀稠含化而安身上及頭面浮腫如蛇狀者

用滴磚街上苔痕一錢水化開塗患處消之肝胆病

眼前常見禽虫或飛或走以手捉之則無用菟活玄明粉酸棗仁青箱子花各一兩為末每服二錢水一盞煎至一分和滓飲之服三次

有虫如蟹走皮下作聲如小兒啼為飢食之化

用雷丸雄黃各一兩為末以豬肉一片搽藥在
上蒸熟喫盡其病自安

寒瘡

面上遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛
痒飲食減少久則透脰○多食鷄肉葱韭自愈
苦校湯

苦校

人參

青鹽

白朮

細辛

各等分

右水二鍾煎至一鍾不拘時服

胡黃連湯

胡黃連

錢一

茯苓

錢四

右用水一鍾煎至七分不拘

時服

礬散

白礬

滑石

研各一兩

右用水三鍾煎至一鍾分

作二服服盡乃安

參黃湯

人參

大黃

各五錢

右用水三鍾煎至一鍾熱

服

三稜散

三稜

蓬朮

各五錢

右為細末每服二錢食前

溫酒調下

癇病門

有十一名

夫癲癇之病皆由驚駭使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成癲病屬之於心癇病歸於五臟令以風癲另立一門又以癲狂合為一門癲與瘈其病狀相類而實不相同也癲病發身軟時醒其症隨痰而作故有時而醒瘈病身強直反張如弓不時醒瘈病挾虛故昏冒遂致亡者多矣小兒之癇有三風癲驚癲食癲也或在母胎中受驚或幼小感風寒暑濕或飲食不節更有陽癲陰癲六畜

癰重者死病後甚者亦死輕者用五色丸主之

○絕脉

洪長伏三脉服妙香丸

絃細緩三脉服五生丸

○不治脉

絃虛急

○不治症

神亂目瞪如愚病後甚者

尋衣五癰重者

○治法

凡五癰屬痰火驚不必分治行痰為主用黃連
南星瓜蒌仁痰與火要分多少如痰多必用
吐法後用安神丸隨服涼藥清其心

凡癰病發不先目瞪如愚者用三聖散更用火
盆於暖室中令汗吐下三法並行次用通聖
散百日愈如若目瞪似愚者不可治

凡治癰前人用清心鎮墜之藥雖治熱清痰若
有頑痰膠固此藥難除病在上必先用嘔吐
後方宜服此劑如痰實在裡亦須下之

風癰

緣衣暖汗出風入初時先屈指如數乃是外
因○服猪心湯

驚癇

起於驚怖夜啼乃作是內因○按圖灸之

食癇

先不哺乳吐而變熱後發熱凡先寒後熱者皆
食癇也○服紫霜丸

已上三癇是小兒症

五癇

發則旋暈額頰口眼相引目睛上
搖手足搐搦背脊強直食傾乃戾

馬癇

作馬嘶鳴是心病

羊癇

心

作羊叫聲目瞪吐舌是病

鷄癇

肺

作鷄叫聲反折手縱是病

猪癇

作猪叫聲如尸吐沫是腎病

牛癇

作牛吼聲目直視腹滿是脾病

犬癇

作犬吠聲反折上竄是肝病

陰癇

先身冷不驚掣不啼呼病發時脉沉病在五臟
在骨髓為難治。用溫平補胃燥痰之藥治之

陽癇

先身熱掣後驚啼呼喚而後發癇脉浮病在六
腑在肌膚易治。用寒藥攻治之

安神丸

茯神

三兩

人參

地骨皮

麥門冬

桑皮

甘草

各二兩

馬牙消

二錢

硃砂

二錢

牛黃

五錢

麝香

龍腦

各三錢

烏犀

一兩

金箔

三十片

右為極細末煉

蜜丸如圓眼大金箔為衣冬月溫水化下夏月

凉水化下二三歲者日進二服小兒一九分二

服虛癆發熱咳嗽新汲水化下半丸

五色丸

硃砂

五錢研

真珠末

一兩

鉛

三分

水銀

同

水銀

一錢

硃砂

硃砂

雄黃

一兩

右為末煉蜜丸如麻子大每服三四丸

薄荷湯送下

五生丸

南星

半夏

各姜汁炒

大豆

炒去

白附子

炮去

白附子

川鳥

炮去皮

右為末水丸綠豆大每服三九

至五九不過七九以姜湯送下

礬丹

五癰五疔分陰陽冷熱

黃丹

白礬

各一兩用磚鑿一窠可容二三兩

許先安丹在下次安礬在上以炭五斤煨人炭盡取出細研不經水猪心血為丸如菉豆大每服十九至二十九陳皮湯送下

三癰丸

治小兒一兩

荊芥

二兩

白礬

生半兩右為末麵糊丸黍米大

硃砂為衣姜湯送下二十九

三聖散

沒藥

研

琥珀

研各分

乾全蝎

此妙

右為末每服

三錢用鵝梨汁半盞皂角末一錢濃煎湯一盆

與梨汁相和勻調下須臾吐出涎毒而愈

通聖散

開末

妙香丸

卷

末

猪心湯

開末

紫霜丸

卷

末

癲狂門

有四名

原病式論重陰為癲重陽為狂素問云多病為癲多怒為狂

○可治脉

脉來虛細

○難治脉

脉來實大

○治法

凡癲狂皆是熱多因痰結心胃治宜豁痰鎮心

凡癲狂有中邪者以邪治之

凡癲狂宜大下則愈

凡癲狂宜用吐法

凡癲狂宜用滾痰丸或三聖散吐之

治風癲狂亂走

用秦艽二兩竹瀝一升石膏三兩白茯苓兩半
龍齒一兩半玄參一兩防風一兩生鉄二十觔
用水二斗煮一斗去鉄右藥入鉄水中再煎
至五升去滓入竹瀝和勻不拘時候溫服二合

治邪癲狂大科走

用蝦蟆一枚大者去腸中滓洗淨將腸胃却入腹中入瓶中鹽泥固濟以火燒通赤取出以上

水調服

治癲狂可畏數年不愈

用蟾肚醬金真蜀地來者七兩明礬三兩為末薄糊丸如梧桐子大每服五十丸湯水任下初服覺心胸間有物脫去神氣酒拌再服少甦多服此藥能去痰

治諸顛風

用鯉魚一片製淨切成塊用明礬四兩為末醃
一兩日煎食其疾必愈

三聖散

見癰病門

滾痰丸

見中風門

怔忡門

有三名

怔忡者心胸不安跳動如人捕捉謂之怔忡此心血不足所致也

○絕脉

寸口脉動弱為驚為悸 浮脉為胃氣虛

寸口脉緊浮滑是氣虛 微脉為陰血虛

○治法

凡怔忡屬血虛有痰

凡怔忡時作時止者痰因火動

凡怔忡瘦人是血少肥人多是痰循常人亦是
痰時覺心跳是血少

怔忡

或因喜富貴怕貧賤思所愛不遂漸成怔忡其
症舌強恍惚喜憂悲少顏色○治宜專補心血
四物湯安神丸之類加痰藥

勞役心跳

用硃砂

研

白芍藥

炒

當歸身

酒

柏葉

各

三

川

芎

陳皮

甘草

各

一

黃連

炒

錢

右為

細末

猪心

血為丸棗豆大溫湯送下

有六淫閉塞亦令人怔忡

服朱雀丸

朱雀丸

白茯苓

二兩

沉香

五錢

右為末蜜丸赤小豆大參湯

送下三十丸

四物湯

見諸血門

安神丸

見癰病門

驚悸怔忡

有三名

驚悸者惕然恐怖謂之驚心下築然而動怯怯如人所捕謂之悸此因心虛胆怯精神短少或因痰所致耳

驚悸

或因事驚或聞虛響或見異恠登高涉險心神氣與痰鬱其症短氣體倦自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安○用養心湯寧志丸心虛膽怯易驚

用二陳湯加竹茹枳實水姜煎服

心氣鬱滯多驚

用菖蒲一寸半夏五錢白朮厚朴各五茯苓

紫蘇各一兩甘草炙遠志銘右分為四服每

服水二鍾姜三片煎九分食後服

養心湯

黃芪炙白茯苓去茯神去半夏麴當歸

川芎錢各五遠志炒栢子仁酸棗仁炒五味

人參錢各半甘草錢二右分作四服每服水二鍾

姜三片棗一枚煎九分服停水驚悸加換柳

寧志丸

白茯苓

茯神

去木

人參

栢子仁

當歸

遠志肉

琥珀

酸棗仁

熟酒拌
炒各五錢
紙

乳香

石菖蒲

朱砂

各二錢半

右煉蜜丸

如梧桐子大每

服三十丸食後棗湯送下

二陳湯

見痰飲門

健忘門

有三名

健忘者陡然而忘其事謂之健忘此心血耗脾氣衰之所致也

健忘

服加減一日萬言丸

思慮過度勞傷心脾健忘

服歸脾湯

心氣不足恍惚多忘

服定志丸

歸脾湯

甘草

錢半二

白朮

茯苓

酸棗仁

蒸

圓眼

黃芪

各一兩

人參

木香

錢各五

右分作七服每

服水二鍾姜一片棗一枚煎九分食後服

如咸日記萬言丸

天門冬

去心

麥門冬

去心

生地黃

丹參

各半

茯苓

白芍藥

五味子

當歸

甘草

各一

遠志

圓眼肉

石菖蒲

酸棗仁

蒸

柏子仁

人參

路五

熟地黃

兩半

右為末用蜜一觔煉滴水

成珠為度入煎藥末

竹干下為丸如菜豆大每

服二錢食後白滾湯或酒送下

定生丸

石菖蒲

人參

各一兩

白茯苓

五錢

煉蜜丸如梧

桐子大朱砂二錢研極細末為衣每服二十丸

米飲送下

治健忘烏鬚延壽方

白菊花

溫者三斤

白茯苓

去半斤

白牽牛

四兩

人參

甘州枸杞子

四兩

右共為細末用蜜二觔煉成珠

為度杵一下分作三百六十九丸每日子時細嚼

一丸華池水送下或酒或鹽湯亦可服六箇月

見効

不寐門

有六名

有病後虛弱者有年老血虛者有痰在膽經神不歸舍者病各有因治亦從其所因也

病後不寐

用八珍湯加酸棗仁

年高不寐

用補中益氣湯加酸棗仁

有痰不寐

用二陳湯加竹茹枳實酸棗仁

傷寒不寐

見傷寒門

驚駭不寐

用二陳湯加竹茹枳實酸棗仁

八珍湯

即是四君子湯四物湯並見氣血二門

補中益氣湯

見注夏門

二陳湯

見痰飲門

腋臭門

有五名

口臭身臭

丁香霍香青木香豈蔻子白芷當歸桂心零陵
香甘松香附各五錢栴柳一枚右為末蜜丸如
鷄豆大日三次夜時含之咽津五日內口臭十
日內身香禁五辛臭氣之物

腋臭如狐狸

白礬燒令汁盡黃丹各五錢鉄粉雄黃膩粉各
五錢為末每夜先以皂莢水洗過用唾津調藥

塗擦之

腋臭

田螺大者一箇巴頭去殼一粒胆礬一豆許麝香一字將田螺以水養三日去泥土搗起麝入前藥在螺內以線拴住放礬器內次日化成水凡用須五更時將藥水以手自擦在兩腋下不住手擦藥直待腹內欲行方住手先要揀深遠無人到處生地內去大便黑黃極臭是其症以土蓋之不可令人知之如不盡再以藥水抹之又去大便次日以枯礬擦之可去病根

陰汗鵝臭兩腋臭不可與人同行

白礬蜜佗僧黃丹各等分麝香少許研如飛塵以醋於手心內調藥擦兩腋下經二時辰却以香白芷煎湯洗之一日用一次

體氣

枯礬輕粉蛤粉蜜陀僧麝香各等為極細末每用少許擦之

疝門

有二十八名

經云任脉為病男子內結為七疝女子為白芷癥
瘕任脉疝之本源各臟疝之支流也任脉即陰血
在臍下三寸與督脉相並邪入小腸畢丸即病畢
丸即陰子也係腎貫肝絡肺系起于寒濕者多凡
內外之氣聚於胞囊小腹兩陰相併二氣相搏則
為疝為痛矣查考諸疝雖有三十四名其中有名
無症無形不錄外有名有症有形有脉者當臨期
審察若因七情得者治宜調氣安五臟或外邪相

干宜散溫祛寒先去邪之實後補肝之虛則治之不謬矣

○總脉

肺脉來沉為肺疝

心脉急滑為心疝

脾脉來絃為脾疝

肝脉緊滑為肝疝

腎脉滑沉為腎疝

寸口緊絃為寒疝

○辯驗疝氣來歷法

疝病畢丸車小腹痛是也畢丸俗名卵子其症或無形有聲或有形有聲或痛或不痛或上或下其形大者如瓜狀小者如圭狀因寒

濕入於諸經積久復得寒邪外束所以成諸
疝而成痛各邪皆聚於陰器非腎經獨主但
腎受邪名曰木腎又名腎氣邪入膀胱名曰
膀胱氣邪入小腸名曰小腸氣因三經相連
相會受疝之病多也

○熨立氣痛法

用鹽一二勛炒極熱舊布裙包鹽熨痛處拉
冷再炒再熨痛減為度○又法用艾置臍中
以熨斗盛炭火熨之如無熨斗銅杓代之

○治法

凡疝痛宜通利不宜補宜溫劑不宜涼藥
凡疝病用茴香丸隨症加減服次用敷藥
凡正氣虛極先溫補而後通利用吳茱萸丸
凡邪氣盛極宜先通利而後溫補用海藻丸
凡疝痛不宜用瀉藥

凡諸疝用枳實山梔吳茱萸各炒山查肉桃仁
川烏荔枝核青皮

凡治虛疝脈大者是也用人參白朮梔子香附
黑瘦人去人參

凡疝氣因虛寒而成者便不可驟補必先滌其

邪而後補之

凡疝氣極甚上衝如有物築心胸欲死手足冷者用硫黃瓦器中溶化即投水中一二時去毒研細陳皮荔枝核炒焦黃色各等分為末飯丸如梧桐子大每服三四丸酒送下痛立止甚者用六丸不可多二三服除根

凡治癰疔要藥用蒼朮南星半夏白芷川芎枳實山梔

厥疝

厥逆心痛足寒諸飲食吐不下

癰疔

腹中氣乍滿心下盡痛氣積如堅

寒疔

因濕地雨水風涼處侵內過多其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或睪丸痛宜溫劑下之久則無子或寒飲食即脇下腹中盡痛

氣疔

因號哭忿怒氣鬱之而脹哭怒止即發其肚上連腎區下吸陰囊宜疔氣藥下之小兒有此疔因父精怯故不治

或腹中乍滿乍減而痛

盤疝

腹中痛連臍旁

附疝

腹中臍下有積聚

狼疝

小腹與陰器相引而痛大便難

癰疝

名四

因地氣卑濕江淮所生其狀腫如升斗不痒不痛宜去濕之藥下之

腸癰因房勞過度原臟虛冷腸道不收墜
出腸外難治

氣癰因七情疝氣下墜陰癰腫脹

水癰濕氣得之陰器腫脹

卵癰因勞役坐馬致卵核腫脹或偏大小難治
婦人陰癰陰門挺出

已上諸癰非斷房事厚味不可用藥癰疝不
痛者用蒼朮神麴白芷山柎川芎枳實半夏

疝

與氣疝大同小異狀如仰瓦卧則入小腹行立

則出入囊中宜逐風順氣

水疝

因醉過內汗出遇風濕之氣聚於囊中其狀腎囊腫痛如水晶或痒極出黃水小腹或按之作水聲陰汗出治宜逐水

筋疝

因房事服久戰藥致陰莖腫或潰膿或痛而裏魚筋縮或挺不收或白物如精或莖痛痛極則痒宜滋陰降火

血疝

因氣血流注滲入腠囊留而不去結成癰腫多
血狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨際云便癰治宜
和血

心疝

其症心與小腹冷痛悶不已腸鳴氣走身寒自
汗

木腎

因腎虛寒冷凝滯其間腫大作痛或頑痺結硬
用雄黃楮葉為末酒糊丸空心酒下五六十丸
小腸氣

服苦練散

膀胱氣

服群卒散

奔豚氣

痛不可忍即腎之積見積聚門

蟠腸氣

即絞腸沙痛見腹痛門

敗精不出結成疝痛

因慾事精不得出。用阿魏二兩醋煮蕎麥麵炒熟枳殼各二兩為末赤芍藥煎湯丸如梧桐

子大塩酒空心或食前送下百丸

因瘀血結在肝經成疝痛

用桃仁承氣湯作丸藥酒送下百丸

因痰飲食積流入肝經聚成核痛

用二陳湯加神麴麥芽山柎

脾受濕熱傳大腸惡寒發熱小腹連陰毛際結核

悶痛用山梔炒桃仁去皮尖摘核炒山柎蒼朮

澤瀉俱炒等分姜三片水煎空心服

寒濕熱三氣鬱而成疝痛

用梔子烏頭水煎服

吳茱萸丸

吳茱萸

炒

乾姜

炮

赤茯苓

甘草

炙

各

桂心

各

白朮

炒

半夏

炒

赤芍藥

當歸

微

前胡

各

川椒

陳皮

人參

附子

炮

大

木香

川椒

各

川椒

各

右為末

蜜丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

九白湯

送下

一日服

四次

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

元花九

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

元花

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

赤芍藥

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

吳茱萸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

半夏

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服

二十

丸

如梧

桐子

大每服七丸溫酒送下一日三次當下如泥

香湯

木香分三

赤茯苓

芍藥炒

當歸焙

枳榔

細辛

人參

青皮炒

前胡

各一兩共為

末每服五錢水鍾半煎八分利去滓溫服

金鈴子散

金鈴子

去皮核取肉一兩用巴豆七粒去殼同炒黃色咸去巴豆

右為末每

服二錢空心酒調服

抵毒丸

狼毒炒

川烏炮

荒花各兩

川椒炒

乾姜

乾漆

炒烟盡

三棱

鱉甲

炙醋

末藥

各五錢

全蝎

去毒

右為末醋糊丸如梧桐子大每服四十九

空心酒送下孕婦不可服

本香散

木香

乾姜

炮

良姜

訶子

去核

陳皮

枳實

炒各半錢

草豆蔻

川芎

黑牽牛

各一錢

右

水二鍾煎至一鍾食前服

昆布丸

昆布

洗鹽炙

海藻

洗鹽炙

蕪荑仁

炒

疾藜子

炒去

去

楨柳

各兩半

枳殼

兩

黃芪

訶藟勒

炮去

去

木香各三錢 桃仁皮尖 絲子酒炒 陳皮各一兩 右為

末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心酒下

雄黃洗丸

雄黃切 甘草各一兩 白礬二兩 右為末每用藥一

兩煎湯五升洗腫處良久再將前湯熱洗候汗

出瘡

海藻丸

海藻洗 川椒炒去 木香 檳榔各半兩 川烏

地小兒用 甘遂各五錢 吳茱萸四錢 茴香炒 楮荅

澤瀉炒各三錢 白牽牛炒取頭末二兩 黑牽牛炒取頭末五錢

右為末水丸如梧桐子大每服五十丸至百丸
空心酒送下利下黃涎是驗十五歲以下者服
二十五丸至五十丸忌甘草相友

補腎湯

沉香

分五

附子

炮去皮

白朮

炒

黃芪

木瓜

人參

茯苓

各錢半

羌活

芎藭

紫蘇

甘草

各錢一

右用水二鍾煎至一鍾食前服嘔吐

加半夏一錢生姜七片

木香導氣丸

木香

八角茴香丁香

川練子

乳香

香附

童便

破故布

葫芦巴

京三稜

甘草

各一兩

杜仲

炒無系

右為末酒糊丸如梧桐

子大每服三十丸加至五十丸空心酒送下日

進二服

敷藥法

治腎囊

牡蠣

煨

良姜

各一兩

右為末津唾調敷大便處

煩更如火熱着痛即安

葫芦巴丸

葫芦巴

八兩

茴香

炒六兩

大巴戟

去心

川烏

炮去皮

三兩

吳茱萸

五兩

川練子

去核

煨

右為末酒糊丸如梧

桐子大每服十五丸空心酒送下小兒五丸

一捻金散

治疳積不可忍

玄胡索

炒

川練子

炒

全蝎

炒

茴香

炒

附子

炮去皮兩半右為末每服二錢痛時熱湯調下甚者

再服

喝起丸

杜仲

葫蘆巴

炒

破故紙

炒

小茴香

鹽水炒

草薢

炙

胡桃肉

去皮

各一兩

右為末

入胡桃肉

各一兩

和勻為丸如梧桐子每服四十丸空心酒送下

苦練散

川練子

一兩用巴豆肉十五粒同炒黃色煉去巴豆用

茴香

鹽炒

木香

略一右為末空心酒調下一錢

群萃散

山梔

五十粒燒一

附子

一兩

每服

二錢

酒煎服

桃仁

承氣湯

先服

二陳湯

先服

二陳湯

先服

茴香丸

開水

消渴門

有十五名

消渴本乎熱有內外虛實之分三焦受病三焦乃是右腎命門元氣之所使有名無形而有氤氲之氣耳上焦在肺主納不出中焦在胃主腐爛水穀下焦在腎主出而不納故有三消之名上消多飲水而少食小便清利中渴頻食易飢而飲水少小便黃赤下消小便頻頻初發為膏淋如油狀至病成面色薰黑形瘦耳焦小便濁而有脂膏除此三消之外更有內消臟腑所感不同病皆出於燥熱

消渴疾愈須預防發癰疽必要服忍冬花五六兩其病愈後尚且為害不輕況病在於不愈之際乎

○吉脉

數大沉小

○凶脉

浮細短實堅大

○不治症

下消能食及不能食

如飲食如常無妨

○死症

內消

○治法

凡消渴宜養肺降火生血為主

凡上消中消用藥太急成中滿膨脹正謂上消不除中寒復生

凡諸虛不足胸中煩悸時常消渴或先渴而後發瘡腫或發癰疽而後渴者並用黃芪六兩去蘆蜜炙甘草一两蜜炙每服三錢水一鍾半棗一枚煎七分不拘時服

凡消渴胃氣不行多飲水是血病服辛甘藥益之

凡消渴不可服膏粱芳草石藥反助燥熱
凡用秘方總治三消用黃連炒天花粉二味為
末藕汁人乳生地黃汁少加姜汁蜜為膏二
味和勻徐徐畱舌上少頃白湯下

凡治消渴天花粉蘆根麥門冬知母竹葉牛乳
此六味是要藥也滑石禁用如天令濕氣太
過者可暫用耳

上消

肺病

多飲水少食舌上裂大小便如常是心熱移於
脉○服人參白虎湯

中消

胃病

多食少飲水肌瘦小便黃赤是胃中有熱飲食入傳送太急不生津液○服調胃承氣湯

下消

腎病

煩噪耳輪焦乾小便多初發為淋如油是肺腎引火水易虧也能食變癰疽不能食變中滿服脹皆為不治之疾○服加減地黃丸

內消

腎虛兼服丹石藥不渴小便多唇乾咽燥精泄瀉名曰內消其症不治○服桑白皮湯

食肥甘藥石渴

服加減三黃丸

中暑熱渴

用酒煮黃連丸。假如小便不利或渴或不渴
知內有濕宜滲利小便自利而渴知內有燥症
治宜潤之

醉飽後房勞渴

服黃連丸煎知母天花粉湯送下

胃虛不能食大渴

服七味白朮散

消渴

飲水石斗病極○服梅花聚湯

三消日夜無度

用神仙減水法

久渴旬日見効

服胫脛散

消渴後成癰疽

服玄參散

消渴後成虛乏

服填骸煎

藏病機法卷八 消渴

消渴後成腹脹

服赤茯苓湯

消渴後成浮腫

服葶藶丸

人參白虎湯

人參

錢三

石膏

錢四

知母

錢二

黃芩

錢二

甘草

杏仁

錢一

右水

二鍾

黃米

一撮

煎至

一鍾

服

赤茯苓湯

赤茯苓

赤芍藥

枳殼

錢二

人參

錢五

白朮

前胡

枳榔

桂心

錢三

厚朴

錢二

甘草

各五錢

右分作五服每用水二鍾棗一枚煎至一

鍾食前溫服

桑白皮湯

桑白皮 麥門冬 白茯苓 乾葛 山藥

人參各一兩 桂心 甘草各五錢 右分八服每水

二鍾煎至一鍾不拘時服

梅花聚香湯

天花粉 烏梅肉 枇杷葉 麥門冬 魚芪

五味子 瓜蒌仁 人參 乾葛各二兩 檀香

錢二右為末水調隨意服之

七味白朮散

白朮炒

白茯苓

白芍藥

人參

前胡

枳殼

北五味

藿香葉

乾葛粉

木香

甘草

各錢

右分作二服每服水二鍾煎至一鍾

食遠溫服

玄參散

玄參

大黃

以微

羚羊角

剉

犀角屑

沉香

木香

黃芪

各一錢

甘草

三分

右為細末每服一

錢五分溫井水調下不拘時服

忍冬丸

忍冬花即金銀花不拘多少用酒拌入瓶內浸糖火
煨一宿取出晒乾入甘草少許為末丸如梧桐
子大每服百丸酒送下

神仙減水法

天花粉 交門冬 白匾豆炒 黃連炒 浮萍

苦參炒 人參 知母炒 黃芪各二兩 黃丹

妙右為細末每服藥末一錢新汲水調下

腫腔散

桑礪硝 牡蠣煨 黃連炒 苦參炒各二錢

土灰根二兩 鹿角膠炙 白石脂各一兩 右為細末加

入鷄胫鷄腸具各五白龍骨漏蘆俱為末和勻
每服一錢半米湯調下日進三服

加減三黃丸

黃芩

春四兩 夏六兩 秋六兩 冬三兩

黃連

春四兩 夏七兩 秋三兩 冬二兩

大黃

春三兩 夏一兩 秋二兩 冬四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子

大每服二十丸空心白滾湯送下

填髓煎

白茯苓

山茱萸

去核

麥門冬

去心

附子

炮去脂

巴戟

石鑊

去根

牛膝

酒洗

當歸

酒洗

兔絲子

酒洗 各二兩

桂心

黑豆

炒三合

石薺

淨冬

五味子

遠志

人參

各三兩半

天門冬

去酥

右為

細末

生地黃汁三

觔以瓦器內隔湯慢火煎一日後入諸藥末蜜

二兩牛髓五兩再煮一日丸如彈大米飲送下

一丸

葶藶丸

葶藶

隔紙炒

瓜蒌仁

杏仁

炮去皮尖

陳防已

各一兩

右

為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前白

滾湯送下一日服三次

黃連丸

黃連

少五兩

麥門冬

去心

天花粉

各五兩

右為末乳汁

和勻杵千下丸如梧桐子大每服五十丸食前
米湯送下

調胃承氣湯

見脾胃門

加減地黃丸

見血門

酒煮黃連丸

開胃末

損傷門

有七十名

古謂正骨金瘡科今名損傷門前人不兼中風論
治至楊徐劉三公增益余玩此科再加驚駭為主
治始尽善矣凡從高墜下責撲閃肭牛撞馬剔木
石墻屋倒壓必先驚而後傷須辯上下輕重淺深
之異經絡氣血多少之殊又分瘀血停積亡血過
多如停瘀者峻逐瘀血兼以驚治如老弱之人宜
補而疎之或峻下或補不以驚駭破傷風同治未
為切當且如服行藥過多其脉愈見堅大醫者不

察又以為瘀血未盡而再行之是速其死也因老
弱不禁下而孤恤不行者亦速其死也先逐瘀血
驚涎通經絡和血止痛然後調氣養血補益胃氣
無不効矣

○生脉

金瘡出血脉来沉小者生

内有瘀血腹脹滿脉来堅強實者生

○死脉

金瘡出血脉来浮大者死

金瘡瘀血腹脹滿脉来虛小弱者死

論手有四折骨六出田凡手臂出田此骨上段骨是杵四邊筋脉鎖定或出田亦到損筋所以出臼此骨頃拽手直一人拽頃用手把定此間骨搦教歸窠看骨出那邊用竹一片夾定一邊一邊不用夾頃在屈直處夾纔服藥後不可放定或時又用拽屈拽直此處筋多喫藥後若不屈直則恐成疾日後曲直不得

有胛上出臼只是手骨出臼歸下身骨出臼歸上或出左或出右頃用杵一枚矮斃一箇令患者立斃上用杵撐在於出臼之處或低用物墊起

杵長則墊凳起令一人把住手拽去凳一人把住
存杵令一人助患人放身後上坐落骨節已歸窠
矣神効若不用小凳則兩小梯相對木棒穿從兩
梯股中過用水把住水棒正稜在出臼腋下骨節
蹉跌之處放身從上墜下骨節自然歸臼矣
脚六出臼四折骨或脚板上交胥處出臼須用一
人拽去自用手按其骨節或骨突出在內用手正
從此骨頭拽歸外或骨突向外須用力拽歸內則
歸窠若只拽不用手整入窠內誤人成疾脚膝出
臼與手臂肘出臼同或出內出外亦用一遍灰定

此處筋脉最多服藥後時時用屈直不可定放又恐再出竅時時看顧不可疎慢

正骨金瘡頭看脉候如傷臟腑致命處一觀其脉虛促危矣傷虛淺命脉虛促亦為後慮傷至重命脉和緩亦無慮也脉有虛有實有去來有疎密或被傷藏脉不死者必關脉實重則無慮或傷至死處其關脉無別脉洪大則難醫如用兩件藥後脉不轉動急急住藥看脉漸漸隨藥轉此則可治無慮或血出甚者脉不要洪大不要疎密亦不要進退來去恐其變凶看傷脉每與內科脉不同或傷

內或致命或難醫處被傷者命脉便已去矣此等切勿治之

中不治證

擗撲損傷或被傷入於肺者縱米即死二七難過
左脇下傷透內者 腸傷斷一半可醫全斷者
不可治 小腹下傷內者證候繁多者 脉不實
重者 老人左股壓碎者 傷破陰子者 血出
盡者 肩內耳後傷透於內者皆不必用藥

腸肚傷治法

肚上被傷肚皮俱破腸出在外只腸全斷難醫傷

破而不斷者皆可治療。腸及肚皮破者用花乳石散傳線上輕用手從上縫之。莫待糞出清油熬活於入肚內。肚皮裂開者用麻縷為線或柰桑白為線亦用花乳石散傳線上。須用從裏重縫。肚皮不可縫外重皮留外皮間用藥摻待生肉。

用藥加減法

凡損者不折骨不碎則不可用自然銅於藥內除去無痰涎不用半夏。老人有傷骨者脉冷每用加當歸川芎川烏木香丁香人參各半兩白芍藥生地黃此亦是二十五味藥內加減。老人服此。

或傷臟腑者不問老少如有血并痰從口中出者
用清心藥加丁皮川芎半夏入二十五味同服
或皮膚熱者加黃柏皮皂角半兩入二十五味藥
內同煎服

用麻藥法

搗撲損傷骨肉疼痛整頓不得先用麻藥服待其
不知痛處方可下手或服後麻不倒可加曼陀羅
花及草烏五錢用好酒調些少與服若其人如酒
醉即不可加藥

被傷有老有幼無力有血出甚者此藥逐時相度

入用不可過多亦有重者若見麻不倒又旋添藥
此須更未到又添些酒酒調服少許已倒便住藥
切不可過多

用搽藥法

瘡口血出不止則用方中止血藥傳如洗開後瘡
孔大先用真降香龍骨沒藥搽之肉即生瘡孔上
須用油單紙貼瘡孔待膿血汁出莫要蔽塞如夏
月用藥以薄荷葉貼瘡孔一日一度湯洗又用藥
搽如肉上滿瘡口用手搗不痛如好肉一般即用
收瘡口藥敷上若未生實肉切不可先收瘡口裏

面恐為患也

傷破肚皮用藥法

如傷孔大肚腸與脂膏俱出放入內則縫如孔小只有膏出者先用清心藥與服用手擘去膏不用縫此膏出者已無用了不可復入肚中反成禍只須擘去不放此是閑肉但放心去之肚肉破傷者專用退利大小腸不可待秘恐成重患

打槓及樹木壓徧身痛者

打槓樹木壓或有高處槓下者此等傷皆驚動四肢五臟必有惡血在內專怕惡心先用清心藥打

血藥次第先服臨服加童子小便入藥內立效專
用大小腸洗利恐作隘塞利害之甚清心藥加前
方通利大小腸藥服之自然俱通無悶煩無惡血
汚心次後用止痛藥服之即止

去惡血法

擗撲傷刀石傷諸般傷損至重者皆先服清心藥
次服清小便藥三服去血藥或被傷者血未結打
從瘡口出或結在內用藥打入大腸時即泄或被
打被擗被木壓惡血未積者用藥打散四肢或歸
臟腑者或歸上膈者打後口中吐出或歸中膈打

入大腸泄出先用此急救次服止痛藥即二十五
味藥中加減用

用藥湯使法

凡藥皆憑湯使所使方先但用清心藥煎後入童
便一盞同服或止痛重傷者則用姜湯燈心湯調
二十五味藥服之薄苛湯亦可

凡刀傷及損內臟腑恐作煩悶崩血大患如折骨
者用姜酒服接骨藥傳之如骨碎被重打重損重
木及石壓者皆用先服湯使法並不用酒服如輕
損撲損傷則用姜湯調下二十五味藥立効

治癰撲傷骨碎骨折筋斷刺痛不問輕重並治之

香白芷

醋炒

紫金皮

醋炒

川當歸

鹽炒

劉寄奴

川芎

赤芍

米泔浸炒

木賊草

黑牽牛

微炒

川牛膝

茶浸

乳香

破故紙

醋炒

骨碎補

生地

鹽水拌炒

自然銅

羌活

川烏

煨不用

藿香葉

沒藥

木通

官桂

草烏

醋炒

獨活

各一兩

熟地

鹽水拌炒

杜牛膝

茶浸

木香

各五錢

右金刀傷剉白者去自然銅骨碎補骨折

者用之然須於此方內去自然銅臨好時却入

用之如早服以成他疾同研為末用蜜為丸如

彈子大用黃丹為衣或被癰撲損傷金刀剪鑿

不問輕重每服一九溫酒磨化服或細嚼酒送下如被刀傷全斷內損重者以薄苛湯或木灰湯姜湯澄心湯皆可服病在上食後病在下食前在中者不拘時服

治從高墜下惡血流於脇下疼痛不可忍

大黃

酒炒

桃仁

五

柴胡

當歸

各二

甘草

天花

粉

紅花

五

右用水一鍾

酒半鍾煎至六

分食前服

治墜馬落車及損折傷

附子

炮去

澤蘭

炒

甘草

各五

桂心

四

當歸

芎藭

錢各七

蜀椒

錢三

右為末每服一錢食前溫酒

調服日進三服忌食海藻松菜生葱冷水

治打撲損痛不可忍

沒藥

別另

乳香

別另

肉桂

去皮

當歸

焙

白芷

甘草

一以各曲

白木

炒五兩

右為末研勻每服二錢不

拘時溫酒調服

治撲傷損筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及拘急

身體倦怠四肢少力

沒藥

別另

當歸

酒洗

骨碎補

煨

白芍藥

川芎

生地黃

川烏

生去

自然銅

人乳

醋

辛十

二次

分右為細末以生姜自然汁與煉蜜和丸每一
兩分作四丸每服一丸搥碎用水酒各半鍾入
蘇木少許煎至八分去蘇木空心服

治一切金刀折傷打撲身軀血出急於傷處搽藥
如有內損血入臟腑熱煎童便入酒少許調二
錢服之立効若牛舐腸出不損者急送腸入用
紬絲或桑白皮線縫合肚皮縫上搽藥血止立
活如無桑白皮線用麻線縫之亦可並不得封
裹瘡口恐作膿血如瘡乾以聿液潤之然後搽
藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死胎衣不

下並用童便調服

花蕊石

為一兩搗末

硫黃

兩上明者

為末

右二味和勻先

用紙筋和盪泥固濟罐子一箇候乾入藥於內

再用水泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五

行字用炭一秤籠疊周匝於巳午時從下著火

令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐

令取出細研磁瓶內盛依前法

治打撲傷損敗血流入胃脫嘔吐黑血如豆汁

百合

水浸一日

芎藭

白芍藥

當歸

荊芥

各二錢 右水鍾半酒半鍾煎至八分不拘時服

治重物壓傷或從高墜下或吐血不能禁止或廢

血在內胃腹脹滿喘促氣短

當歸

二兩

大黃

二兩

右為末每服三錢酒調溫服

治打撲傷折內損肺肝

紫金皮

補骨脂

降真香

魚名異

火燒酒

牛膝

酒浸

桃仁

去皮

當歸

酒洗

琥珀

研

川續斷

蒲黃

各一兩

大黃

濕紙

朴硝

另研

右為末

每服

二錢食前濃煎蘇木當歸酒調服

治打撲內損筋骨疼痛

自然銅

一錢

五分

火

沒藥

乳香

川芎

為藥

當歸

川椒

去日合口
者各半兩

右為末用

黃蠟二兩熔開入藥末不住手攪勻丸如彈子
大每服一丸用好酒一鍾化開煎至五分乘熱
服之隨痛處卧連服二三丸立効

治打撲傷折手足

右用菜豆粉新鐵銚內炒令紫色用熱酒同執
醋調令成膏傳貼損處用紙花蓋貼用杉木一
片或二片縛定其効如神

治癰疽發背諸般瘡癰從高墜下打撲傷損脚膝
生瘡遠年腫瘡五般痔漏一切惡瘡立治之

龍骨

鱉甲

苦參

烏賊魚

骨

黃栢

黃芩

黃連

猪牙皂角

白芨

白欬

厚朴

當歸

洗

香白芷

木鱉子

仁草

烏

川芎

各一兩

沒藥

研

乳香

研

各

黃丹

片

過

槐枝

柳枝

各四寸長

一條

清油

和

右除乳沒丹外將

諸藥於油內慢火煎紫色去滓秤淨油三斤放

鍋內下丹不住手攪令黑色滴入水不散及不

粘手下乳沒再攪如硬入油些少不粘手為度

治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結聚疼痛

荊芥

一兩

細辛

大

蔓荊子

香白芷

桂心

川芎

丁皮

防風

去

羌活

各半

右作

一服入鹽半匙連根葱五莖將水五升煎取二升去滓通手淋洗痛處冷即再易避風處洗之治諸瘡口入風為破傷風項強牙關緊急欲死者防風南星各二右為細末每服三錢童便一大鍾煎熱調不拘時服

治新舊諸瘡破傷中風強項背直腰反折口噤不語手足抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之

麝香

另研五分

硃砂

一兩

草烏

三兩

生黑豆

三錢

右

為末研勻破傷風以酒調一錢不拘時服如出

箭頭先用酒調一錢就將此藥貼上箭瘡上

治破傷風止血定痛

蒼朮

六兩

川烏

炮去皮

兩頭尖

炮各

白朮

草烏

炮去皮

防風

細辛

各二兩

蠲稍

微

川芎

雄黃

各五錢

右為末每服一錢不拘時酒調送下

如損骨拆加乳香五錢

治破傷風

草烏

天麻

略半

金頭蜈蚣

一條去足

錢五

金蝎

錢香白芷

錢

右為細末每服五分如發熱茶清

調下不拘時服

打撲傷損金刀箭鏃傷處浮腫用此

紫金皮

醋

川烏

炮

草烏

炮

黃柏

鹽水

南星

川當歸

杜當歸

破故紙

川白芷

鹽

川芎

川牛膝

劉寄奴

桑白皮

半夏

各等

烏藥

各等

右為細末生薑薄許汁兼水調傳腫處或

傷處皮熟甚加黃柏皮生地黃半兩有瘡口者

勿封瘡口四邊傳之

治傷骨節不歸窠者用此麻之然後下手整頓

木鱉子

杜當歸

紫金皮

猪牙皂

角

川芎

白芷

烏藥

半夏

川烏

各二

草烏

胎上茴香

各一

木香

右為

細末

諸骨

碎骨

拆

出曰者每服一錢好酒調下麻倒不知疼處或

用刀割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨筋歸

元端正用夾板夾定然後醫治或箭鏃入骨不

出亦可用此藥麻之或鐵鉗拽出或用鑿開取

出若人昏沉後用鹽湯或鹽水與服立醒

治皮破筋斷

右用白膠香為末傅之又方用金沸草根搗汁

塗筋上封口便可相續止痛

治拆傷後為四氣所侵手足疼者

川山甲

去臘桑柴灰炒起為度

茴香

炒各破故紙

草烏

骨碎補

去毛各

蒼術

右除草烏用生姜一觔

搗爛同草烏淹兩宿晒乾為末酒煮麴糊為丸

梧桐子大每服五十丸用酒或米飲下忌熱物

治打傷損手足疼痛不可忍者

白芷

錢五

白朮

乳香

沒藥

各肉桂

當歸

錢五

粉草

右為末每服二錢酒調下

治腰脊痛或打撲損傷從高墜下畱在太陽經令

人腰脊或脛膂臂腰中痛不可忍

地龍

官桂

蘇木

各九

麻黃

分

黃柏

諸痛捷法卷八

當歸稍甘草各錢半桃仁九右作一服水二鍾

煎至一鍾食前服

治跌撲損傷疎利後用此藥調理

川芎當歸芍藥黃芩各錢半青皮

烏藥陳皮熟地黃乳香研另茴香

銘一右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

治金瘡白藥

赤芍藥牡丹皮生地黃木鱉子去殼當歸

地骨皮桑白皮黃柏黃芩黃芪

甘草黃連各錢半白芷馬蓼稍葉各錢一

右用桐油二兩煎黃色濾去滓再煎油稍熟
入細白板松香一片慢火煎頃頻頻用柳枝攪
勻却入沒藥乳香滓布上濾過先用瓦鉢滿盛
清水八分却瀝藥於鉢水中將去清水中如綳
紙伏綳三二百度愈綳愈白故名白藥常以清
水度傾於冷地上用物遮蓋勿令塵入五七日
一換水刀斧二三應傷量傷孔大小取一塊填
於傷孔中以白紙護之隨手不疼一日一換五
日生肉筋斷加杜仲續斷各二錢同煎收瘡口
加龍骨五分研碎煎入藥內打損只敷油紙上

貼之即愈却不須入接筋龍骨等劑之妙

治金瘡辟一切風冷續筋骨

芎藭

艾葉

各五錢

石灰

二升

搗生

地黃

清

高

研

赤

研

麒麟竭

細研

地松

各三錢

三

狗頭灰

細研

蜜陀僧

各五錢

五

黃丹

兩一

右為末

和勻

密封之

每遇金瘡

傳之

治金瘡箭鏃不問輕重并癰疽疔毒用此傳之

白膠香

乳香

石膏

研

白芷

蒼朮

沒藥

黃丹

各五錢

五

右為末

用真麻油

四兩

桐

油亦可以黃蠟一兩先煎油柳枝撓次入白芷

等藥煎少頃却入白膠香石膏得同煎試欲成

珠却入蠟同煎片時用生布濾過瓦器收藏用
油單紙攤之損傷傳瘡口自然肉不痛速愈
治金瘡

右五月五日平旦使四人出西方各於五里內
採一方草本莖葉每種各半把勿令漏脫一事
日正午時細切碓搗并石灰極令爛熟一石草
斷一斗石灰先鑿大竇中桑樹令可受藥取藥
納孔中實築令堅仍以桑樹皮蔽之用酥油搗
石灰極粘密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使
堅牢至九月九日午時取出陰乾百日築成搗

之日曬令乾更搗絹篩貯放凡一切金瘡出血
傷折即時以藥封裹治使牢勿令動轉不過十
日即瘥不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥
須暖水洗令血出然後傳此藥大驗平時無事
宜多合以備倉卒之要無出於此一方云採時
不得回顧任意摘取方回入杵臼內爛搗如泥
量藥多少以意入石灰和勻取出拍成膏日中
曝乾遇用旋取撚碎若刀斧傷乾傳取血止為
度湯火冷水調開塗敷蛇蝎犬鼠咬傷先以溫
水洗後以津液調傳亦瘡先孤損以藥末乾傷

濕癬以醋調傷其効如神

凡殺傷不透膜者可治

右用乳香沒藥各一皂子大研爛以童便半盞
好酒半盞同藥通口服然後用花蕊石散或烏
賊魚骨或龍骨為末傅瘡口上立止

殺傷氣偶未絕

右取葱白熱鍋炒熱遍傷瘡傷處瀝即再易其
痛自止但青葉亦可

治刀斧傷磕擦及破傷風浮腫者

右用平胃散以姜汁調傷若急卒只以生姜和

皮爛搗晷患處止痛截血且無疤痕

治金瘡肉爛生蛆者

右以皂礬飛過乾貼其虫即死

治刀斧所傷肉損大腸及兩脇肋并腹肚傷破大便從口中出并中大箭遠射傷損腸胃及治產後傷損小腸并尿囊破小便出無節止此方神効餌至一服其藥直至損處補定傷痕隔日開瘡口看之只有宿舊物出即無新惡物出瘡口內用長肉散子作盡子引散藥入瘡內面候長肉出外其痕即有合

地榆

八兩洗淨細末續薄者

右用洗淨續糊以炭

灰淋清汁二斗煮絹灰汁盡為度絹以爛熟壁

成片段五寸至三寸即取出壓盡灰汁於清水

內洗三五度令去灰力盡重入鍋內以水二斗

入地榆末煎煮熟爛以手撚看不作絹片取入

砂盆研之如麪糊得所分為二服用白粳米飲

調空心服之服後仰卧不得驚動轉側言語忌

一切毒食熟爛黃雌雞白米軟飯餘物不可食

之其餘一服至來日空心亦用粥飲調服其將

養一月內切須慎護如是產後所傷服一疋分

作四服每服粥飲一鍾調服日進一服

治木竹刺出血及刀傷

右急以自已小便淋洗二三次立止不妨入水

治金瘡

右以牛蒡葉貼之永不畏風亦不潰膿搗傷之

治刀箭傷筋斷骨止痛定血避風

麒麟竭

白芨

各五錢

密佗僧

黃栢

白芷

白欬

當歸

焙

甘草

炙

各兩

右為細末每用

少許乾搽瘡上立効

治金刀弓弩所中筋急不得屈伸

敗弩筋

洗

秦艽

去苗土

熟地

焙各半兩

附子

炮去皮

當歸

杜皮

去皮炙各一兩

大棗

三枚切

右為細末每服二錢

七溫酒調空心日午夜卧各一服一方

有續筋無大棗

治傷斷筋骨續筋方

右取旋覆根搗汁滴瘡中仍用滓傳瘡上封固

治金瘡腸出宜用之

磁石

研

滑石

研

鐵精

各三兩

右為細末每服

錢七溫酒調空心日午晚間各一服仍以針砂

塗腸上其腸自入一方無鐵精一方白米飲調

治破傷腸出不斷腸出欲燥而草土着腸者

右作大麥粥取汁洗腸推內常研米粥飲之汁
日稍稍作泔糜百日後乃瘡草土當取在皮外
治金瘡中腸出不能入者

右以小麥三升用水九升煮取五升綿漚過候
冷含噴瘡上漸入以冷水噴其背不宜多令人
見亦不要傍人語不可令病人知或尚未入取
病人卧席四角令病舉身搖頃臾腸自入十日
內食不可飽頻食而少勿使病人驚驚則殺人
治金瘡腸出者

右以桑白皮作線縫之更以熟鷄血塗上立愈

毒藥箭頭在身未出

雄黃

細研一分

粉霜

細研五錢

蜚蠊

四枚

巴豆

三粒

去殼研泥生用

右同研勻以銅筋頭取乳汁塗點瘡上頻頻用之七日後瘡熟箭頭自出

治毒箭所中

右搗藍汁一升飲之滓傍瘡上若無藍取青布漬絞汁服之并淋瘡中鏃不出搗鼠肝塗之鼠腦亦得用之即出

治箭頭自出瘡口上

草烏尖

麒麟竭

茄子花

蓖麻子

去殼細研

曼陀羅子

錢各五

右為細末好酒調如膏瘡口上

塗摩之箭頭自出

治箭頭在骨遠年不出

牡丹皮

白欬

各一兩

桑白皮

二兩

藿香葉

丁香

麝香

研各一分

右為細末

每服二錢七溫酒調下日

進三服淺者十日深者二十日箭頭自出

治箭鏃入骨取不出疼痛用此

巴豆

二枚

蟻娘

三枚

右研塗傷處候痛定微痒忍

之極痒不可忍即憾動拔出以黃連貫衆湯洗

畢以牛膽製風化石灰傳之兼治惡瘡

治箭頭在咽喉中或胃膈中及諸處不出者

右搗牛膝不拘多少為末以熱水調塗箭頭即出若火瘡灸瘡不瘡者塗之亦效

治箭頭在肉不出

右以白頃蚯蚓十四條納銅器中次入鹽一兩於日中曝並化作汁塗有傷處須臾痒則出

治取針悞入皮膚

車脂

多不向

右成膏子好攤在紙上如錢許二日

一換三五次其針自出大有神効

治金瘡去血多虛竭用此藥內補

當歸焙

桑白皮

白芍藥

吳茱萸

酒洗桂心

乾姜炮

川芎

人參

川椒

去目并合

黃芩

黃芪

厚朴

去皮姜汁炙

肉苁蓉

四兩酒浸
去皮炒乾

甘草

炙半

右為末每服二錢食前溫

酒調下日三四服一方有白芨無黃芩桑白皮

治金瘡血出腹脹欲死

蒲黃

生地

各兩半

當歸

芎藭

白芷

續斷

各一兩

甘草

炙三

右為末每服三錢七空心

酒調下日三四服血化為水而下若口噤榦開

與之服仍加大黃一兩半

治金瘡血出不止亦治疳瘡

石以五倍子生研為末乾傳瘡上血立止

治金瘡出血內漏

右用蝙蝠二枚燒煙盡為末以水調服方寸七
令一日服盡當下如水血自消也

治諸傷瘀血不散

右於五六月收野苧葉搗爛塗金瘡上如瘀血
在腹用順流水搗爛服即通血皆化水以死猪
血試之可驗秋月恐無葉可早收之

治金瘡煩悶

乾生地

當歸炒

桃仁去皮炒

羚羊角屑 白芷

赤芍藥

桂心各三分

甘草炙

黃芩

續斷

芎藭各一兩

右為末每服二錢食前溫酒調下日

三四服

治金瘡中風角弓反張

生鷄子一枚

烏麻油三兩

右先將鷄子打破與麻油

相和煎之稍稠待冷塗封瘡上

治金瘡中風痙欲死者及諸大脉皆血出多不可

止血冷則殺人

右用生葛根一斤剉碎以水五升煮取三升去

澤每熱飲一小盞日三四服若乾搗為末每二
錢溫酒調服若口噤不開但多服竹瀝即愈
治金刀傷見骨中風口噤

右用大豆炒去腥半熟勿使太熟五升粗搗篩
蒸一饌頃傾出金中以酒一斗五升淋之絞去
滓每溫服五合至七合日二夜一衣蓋覆微汗
出別研生杏仁膏傷於瘡上若腦髓出者難收
治金瘡因風水腫

右取臘不以多少熔化入鹽少許滴在瘡上或
先以鹽罨瘡上後熔蠟令熱得所灌中亦可

治金瘡中風掣痛并手足不仁

用艾葉生熟者令揉團得所納瓦甑中塞諸孔獨留一目通氣惠患處良久身体自知愈

治金刀箭傷生肌長肉定痛止血諸瘡歛口

龍骨

滑石

寒水石

枯礬

乳香

黃丹

炒

沒藥

各五錢

輕粉

錢五

右為細末

每用少

許乾摻瘡上外用膏藥貼之

治刀斧傷辟風生肌止痛

桑白皮

黃丹

炒

陳石灰

風

白芨

各二兩

龍骨

白附子

南星

各一兩

右為細末

每用貼之

治竹草刺瘡發腫作疼傷時不會出血盡被惡毒
注痛不止夜不安初破時其瘡紫赤黑色較時
起三五重皮是也

丹參

半二錢

麝香

一字

綠礬

半兩童便燒熱放於內候冷取出日乾

馬兜苓根半錢右為末將水洗淨瘡口敷貼藥上

治手足卒中刺中水毒方

藍青

韭

半錢

右搗置瘡上以火炙熱徹即愈

治刺入肉疼煩悶百藥不効

右以松脂傳瘡上以帛裹三五日當有根不痛
不痒不覺自落甚良

針入肉方

右刮指甲末同酸棗仁搗爛唾調塗上次日定
出一方用酸棗核燒為末服之

治金瘡杖瘡神効

川牛膝

劉寄奴

黑牽牛

黃栢皮

乳香

破故紙

白繆香

生地黃

熟地黃

沒藥

赤芍藥

白芍藥

紫金皮

當歸

焙

川芎

石膏

煨

黃丹

炒

羌活

各五錢

黃蠟

兩

獨活

白芷

各五錢

清油

兩四

右除繆香丹蠟餘為末入油

內煎以柳枝不住手攪將成膏却入三味又煎

成膏以生布濾淨以瓦器盛水傾在水中用草攤開貼瘡孔深者撚成條穿入孔中不問淺深放瘡上如作熱加輕粉片腦朴硝入膏內貼之生肌桃花散

乾胭脂

密佗僧

輕粉

血竭

銕

一

乳香

錢右研細末每用乾摻仍以膏藥貼之治腫未破用此消腫定痛

無名異

炒

木耳

土

大黃

炒

各

右

為

極

細

末

每

用

蜜水調圍四邊腫處

治金刀箭鏃傷用此生肌

老松皮一斤 石灰二兩 煨者以厚盛之用火
細末和勻敷之止血收瘡口立効

右為